




COVID-19 ワクチンモデルナ(武田薬品)

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

さい
12歳以上の方は新型コロナワクチンを受けることができます。
保護者の方とこの説明書を読んで、ワクチンを受けるか相談しましょう。



新型コロナワクチンは何のために受けるの？

新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナにかかりにくくなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナとたたかう仕組み(めんえき)ができて、実際にウイルスが体に入ってきたときに、すぐたたかえるように準備します。ワクチンを受けることで、新型コロナにかかる人が減り、社会生活の制限が減っていくことも期待されています。



◎ワクチンを受ける日に注意すること



37.5℃以上の熱があるときや、体調が悪いときは、ワクチンを受けられないので、そのことをお母さんやお父さんに伝えましょう。



ワクチンは肩の近く(かた)に注射します。
肩(かた)の出しやすい服で、受けに行きましょう。



ワクチンを受けた後、**15分以上はすわって様子をみましょう。**(30分様子をみる場合もあります。)



当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、**激しい運動はやめましょう。**

このワクチンは間隔をあけて、合計2回接種します。

大切！
守ってほしい
こと

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。

ワクチンを受けた後には、次のような症状が出る可能性があります。



他のワクチンに比べて、発熱や痛みなどが出やすいですが、
2～3日で自然と良くなることがわかっています。
症状が出たら、あわてずにきちんと周りの大人に知らせましょう。

(すぐに起こることがある症状)

● アナフィラキシー

重いアレルギー反応で、じんましんや息苦しさなどの症状が出ます。
からだがかゆくなったり、咳が出たりしたときは、すぐに周りの大人に伝えましょう。

● 血管迷走神経反射

ワクチンを受けることに対する緊張や痛みをきっかけに、血の気が引いて、
立ちくらみがしたり、気を失ったりすることがあります。横になって休めば、自然に治ります。
たおれてケガをしないように背もたれのあるイスですわって休みましょう。



(数日以内に起こることがある症状)

- 注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に注射した部分の痛みを感じる人が多いです。
- 発熱や疲れた感じなどは、1回目より2回目にワクチンを受けたときの方が多くの人に见られます。
(表では、頭痛、疲れた感じ、発熱は、より多くの人に症状が見られる2回目の接種での割合を示しています。)

しょうじょう 症状が出た人の割合	しょうじょう 症 状
50%以上	注射した部分の痛み、頭痛、疲れた感じ
10 - 50%	リンパの腫れ、注射した部分の赤み・腫れ、筋肉痛、 関節痛、吐き気・嘔吐、寒気、発熱

- 注射を受けて数日以内に、胸のあたりの痛み等が出た場合は、周りの大人に伝えましょう。
(※) (保護者の方へ) ワクチン接種後に、ごくまれに心筋炎が報告されています。
- 注射を受けて7日目以降に、注射した部分の痛みや腫れ、赤みなどが出る可能性があります。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、
今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



みっしゅう
密集した場所



みっせつ
密接した場面



みっぺい
密閉された空間



マスクの着用



石けんで手洗い



手指の消毒

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報
については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン

検 索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

